

جدول ۳۳-۱. نتایج درمان بیماران مبتلا به سل ریوی گستره خفط مثبت استان لرستان در سال ۹۳

انتقال یافته		غیبت از درمان		شکست درمان		فوت		موفقیت درمان		تکمیل درمان		بهبود یافته		تعداد گستره خفط مثبت ثبت شده در سال ۹۳
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	۹۷
۰	۰	۳/۱	۳	۳/۱	۳	۱۵/۵	۱۵	۷۸/۳	۷۷	۱۱/۳	۱۱	۶۸	۶۶	

فاصله شاخصهای بهبود (در موارد سل ریوی خفط مثبت) و موفقیت درمان (کلیه اشکال سل ریوی) استان در سال ۹۳ نسبت به سال قبل (به ترتیب بدون تغییر و ۳ درصد) افزایش داشته است و فاصله آن با ارقام مطلوب ۸۵ درصد به دلیل فراوانی موارد فوت (به طور عمده به دلالتی غیرازسل) و غیبت از درمان (تا حدی زیاد در موارد HIV مثبت و سوء مصرف کنندگان مواد) قابل توجه است که به ویژه کاهش موارد غیبت نیازمند تقویت آموزش و مشاوره بیمار و خانواده و افزایش حمایت و پیگیری کارمندان بهداشتی جهت تقویت پایبندی بیماران به درمان است .