

جدول ۲۶-۱. توزیع سنی بیماران مبتلا به سل گزارش شده استان لرستان به تفکیک جنس در سال ۹۳

کل		زن		مرد		گروه سنی
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۲/۸	۵	۴/۲	۳	۱/۸	۲	۰-۴
۱/۱	۲	-	-	۱/۸	۲	۵-۹
۱/۶	۳	۱/۴	۱	۱/۸	۲	۱۰-۱۴
۸/۲	۱۵	۹/۷	۷	۷/۲	۸	۱۵-۲۳
۲۱	۲۸	۱۸	۱۳	۲۲/۹	۲۵	۲۵-۳۳
۱۸/۸	۲۴	۱۲/۵	۹	۲۲/۹	۲۵	۳۵-۴۴
۱۱	۲۰	۱۳/۹	۱۰	۹/۳	۱۰	۴۵-۵۴
۱۶	۲۹	۲۰/۸	۱۵	۱۲/۸	۱۴	۵۵-۶۴
۱۹/۳	۳۵	۱۹/۴	۱۴	۱۹/۳	۲۱	۶۵ و بالاتر
۱۰۰	۱۸۱	۱۰۰	۷۳	۱۰۰	۱۰۹	جمع

بیش از ۵۰ درصد موارد سل شناسایی شده استان دارای سن کمتر از ۴۱ سال هستند (میانگین سنی حدود ۴۱ سال) که نسبت به سال گذشته تا حدی افزایش یافته و در مجموع نشانگر جوان بودن بخش عمده بیماران و گردش فعال عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در جامعه است که باید با تشدید راهبردهای کنترل عفونت به ویژه شناسایی و درمان سریع بیماران مسری و درمان عفونت نهفته در افراد در معرض خطر در راستای افزایش تدریجی میانگین سنی بیماران اقدام گردد. نسبت ابتلا در مردان و زنان در مقایسه با سال گذشته به سوی ابتلای بیشتر مردان تغییر یافته است. (۶۰/۲ درصد مردان و ۳۹/۸ درصد زنان)