

جدول ۵۰-۱. تشخیص‌های نهایی موارد فلج شل حاد شناسایی شده در استان لرستان در سال ۹۳

درصد	تعداد	تشخیص
۲۳/۸	۵	سندروم گیلان باره
۱۴/۲	۳	آرتریت حاد
۴/۸	۱	تومور نخاعی ( نورو بلاستوم نخاعی )
۴/۸	۱	آناکسی به دنبال مسمومیت دارویی با مصرف فتوباریتال
۴/۸	۱	آرتریت حاد غیر چرکی
۴/۸	۱	میالژی
۴/۸	۱	درد گردنی
۴/۸	۱	سینوویت گذرا
۴/۸	۱	سندروم میلر فیشتر
۴/۸	۱	سلولیت
۴/۸	۱	سندرم شلی اندام کودک
۴/۸	۱	اختلال تمادل
۴/۸	۱	آناکسی
۴/۸	۱	بروسلوز
۴/۸	۱	تشنج
۱۰۰	۲۱	جمع

سندروم گیلان باره به عنوان شایعترین علت فلج شل حاد ۲۴ درصد موارد را به خوداختصاص داده و بقیه تشخیص‌های مطرح شده براساس شواهد بالینی و پاراکلینیک موجود و نظر پزشک معالج و تایید کمیته طبقه بندی نهایی دانشگاه تعیین گردیده است .