

جدول ۶۱-۱. موارد گزارش شده عفونت‌های آمیزشی در استان لرستان در سال ۹۳

بیماری	تعداد	میزان بروز در یکصد هزار نفر جمعیت
زخم‌های تناسلی غیرتاولی	۴۰۳۲	۲۱۶/۸
ترشح مجرا در مردان	۱۸۹	۲۰/۳
سیفلیس مشکوک	-	-
سیفلیس قطعی	-	-

موارد گزارش شده عفونت‌های آمیزشی بر مبنای تشخیص بالینی سندروم‌های زخم تناسلی غیرتاولی و ترشح مجرا به عنوان دو سندروم شاخص در برآورد میزان بروز عفونت‌های آمیزشی در جمعیت بوده و موارد سیفلیس مشکوک و قطعی بر اساس نتیجه مثبت آزمایش‌های اختصاصی گزارش می‌شود. اطلاعات جمع‌آوری شده از واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی تنها بخشی اندک از موارد واقعی مراجعه‌کننده را تشکیل می‌دهد و حساسیت پایین نظام مراقبت این عفونت‌ها یکی از معضلات فراگیر در کشور است. با این وجود میزان بروز زخم‌های تناسلی و ترشح مجرا در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۷ درصد کاهش و ۴۵ درصد افزایش داشته است که مرتبط با افزایش نسبی حساسیت نظام مراقبت بیماری‌های آمیزشی در بخش خصوصی در شناسایی و گزارش موارد ترشح مجرا است.